

— **tratamientos** —

# INFLIXIMAB



Sociedad Española de  
Reumatología



Fundación Española de  
Reumatología

## ¿QUÉ ES?

Infliximab es un fragmento de un anticuerpo monoclonal, esto es, una proteína que reconoce y se une específicamente a una proteína llamada factor de necrosis tumoral- $\alpha$  (TNF- $\alpha$ ). Actúa neutralizándola. Se usa para el tratamiento de la artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, psoriasis, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa que no han respondido a terapias convencionales.

### NO DEBE USARSE SI...

- Es alérgico a infliximab o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- Tiene alguna infección que su reumatólogo considere importante.
- Tiene insuficiencia cardíaca moderada o grave.

### CONSULTE A SU REUMATÓLOGO ANTES DE USARLO SI...

- Ha contraído una infección.
- Padece infecciones repetidas o prolongadas.
- Tiene tuberculosis.
- Tiene hepatitis b.
- Tiene insuficiencia cardíaca.
- Ha sufrido cualquier tipo de cáncer.
- Si tiene esclerosis múltiple u otra enfermedad desmielinizante.
- Ha sido vacunado recientemente o va a ser vacunado durante el tratamiento.
- Sigue algún otro tratamiento inmunosupresor.

Vigile la aparición de infecciones y reacciones alérgicas. Infliximab puede ocasionar potencialmente efectos adversos graves,

incluidas infecciones y reacciones alérgicas. Debe vigilar la aparición de signos de estas enfermedades mientras use este fármaco. Interrumpa el tratamiento y avise a su reumatólogo o busque asistencia médica inmediatamente si nota alguno de los signos que indican una posible infección o reacción alérgica graves. Estos signos se incluyen en la sección "Posibles efectos adversos".

### INFORME A SU REUMATÓLOGO SI...

- Está tomando, ha tomado o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.
- Ha sido vacunado recientemente o va a ser vacunado próximamente. No le deben administrar vacunas con virus vivos mientras use infliximab.

## EMBARAZO, LACTANCIA Y FERTILIDAD

Es preferible que evite el uso de infliximab durante el embarazo. Se desconoce su efecto en mujeres embarazadas. Si es una mujer en edad fértil, se aconseja que evite quedarse embarazada y debe utilizar un anticonceptivo adecuado mientras use este medicamento.

### CONSULTE A SU REUMATÓLOGO SI...

- Está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene la intención de quedarse embarazada.
- Está dando el pecho o tiene previsto dar el pecho. Usted y su médico deben decidir si va a dar el pecho o va a utilizar infliximab. No debe hacer las dos cosas.

## ¿CÓMO USARLO?

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su reumatólogo. Infiximab se administra por vía intravenosa.

Su reumatólogo decidirá cuánto infiximab necesita y durante cuánto tiempo. Después de la primera perfusión recibirá una dosis pasadas dos semanas y otra pasadas seis semanas. Posteriormente, recibirá una perfusión cada 8 semanas.

Infiximab es un tratamiento de larga duración. Su reumatólogo controlará periódicamente el estado de su enfermedad para comprobar si el tratamiento es efectivo.

Si recibe más fármaco del que debe o la dosis ha sido administrada antes del tiempo indicado por su reumatólogo, informe a su reumatólogo. Así mismo, si olvidó una perfusión, hable con su reumatólogo.

No es peligroso dejar de usar infiximab pero si lo hace, es posible que reaparezcan los síntomas de su enfermedad. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su reumatólogo.

## POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Igual que el resto de medicamentos, infiximab puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

### EFECTOS ADVERSOS GRAVES:

Interrumpa el tratamiento con infiximab e informe a su reumatólogo o busque inmediatamente asistencia médica si nota alguno de los siguientes efectos adversos:

- **Posible infección grave.** Los signos pueden incluir fiebre; síntomas gripales; sudores nocturnos; sensación de cansancio, dificultad para respirar o tos persistente; piel caliente, enrojecida y dolorosa a la palpación; erupción cutánea dolorosa con ampollas o ardor al orinar.
- **Reacción alérgica grave.** Los signos pueden incluir dificultad para respirar o tragar; tensión arterial baja, que puede causar mareo o un ligero aturdimiento; hinchazón del rostro, labios o garganta; picor intenso de la piel acompañado de erupción o ampollas.

### OTROS EFECTOS ADVERSOS:

La mayoría de los siguientes efectos adversos son leves o moderados. Si en algún caso se convierten en graves, informe a su reumatólogo.

Algunos efectos adversos son **muy frecuentes** (pueden afectar más de 1 de cada 10 personas): infección vírica (influenza, herpes virus), dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, infección vía respiratoria superior (sinusitis), dolor en la zona de la perfusión.

Algunos efectos adversos son **frecuentes** (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas): Infecciones bacterianas como septicemia, abscesos, celulitis, infección urinaria, bronquitis, neumonía, depresión, insomnio, síntoma alérgico respiratorio, disminución glóbulos blancos, anemia, linfadenopatía, taquicardia, palpitaciones,



conjuntivitis, vértigo, mareo, alteración de la sensibilidad, hipotensión, hipertensión, sofocos, aparición de morados, sangrado por la nariz, sensación de falta de aire, hemorragia digestiva, diarrea o estreñimiento, reflujo gastroesofágico, mala digestión, función hepática alterada, dolores articulares o musculares, dolor de espalda, aparición o empeoramiento de la psoriasis, erupción cutánea, urticaria, aumento de la sudoración o sequedad cutánea, eczema, pérdida de pelo, dermatitis por hongos, dolor torácico, cansancio, fiebre, reacción en el punto de la infusión, escalofríos e hinchazón.

Algunos efectos adversos son **poco frecuentes** (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas): tuberculosis, infecciones fúngicas como candidiasis, pielonefritis, vaginitis, disminución de las plaquetas, disminución o aumento de los linfocitos, reacción anafiláctica, síndrome pseudolúpico, enfermedad del suero, pérdida de memoria, agitación, confusión, somnolencia, nerviosismo, crisis convulsivas, neuropatías, inflamación de la córnea, orzuelo, hinchazón alrededor de la órbita del ojo, aparición o empeoramiento de insuficiencia cardíaca, arritmia, bradicardia, síncope, isquemia periférica, tromboflebitis, hematoma, edema pulmonar, broncoespasmo, derrame pleural, perforación intestinal, estenosis intestinal, diverticulitis, pancreatitis, queilitis, inflamación del hígado, inflamación de la vesícula biliar, erupción vesicular, onicomycosis, seborrea, rosácea, papiloma cutáneo, hiperqueratosis, pigmentación anormal de la piel, presencia de autoanticuerpos, alteración de la cicatrización.

Algunos efectos adversos son **raros** (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas): meningitis, infecciones oportunistas, infecciones parasitarias, reactivación de la hepatitis B, endoftalmitis, linfoma, leucemia, melanoma, cáncer cuello útero, agranulocitosis, púrpura trombótica trombocitopénica, pancitopenia, anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica idiopática, apatía, shock anafiláctico, vasculitis, reacción similar a sarcoidosis, mielitis transversa, enfermedades desmielinizantes, derrame pericárdico, insuficiencia circulatoria, petequias, vasoespasmo, enfermedad pulmonar intersticial, hepatitis autoinmune, ictericia, lesión granulomatosa, alteración del complemento, necrosis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme o furunculosis.

Algunos efectos adversos han sido descritos pero **no se conoce la frecuencia** con la que aparecen con infliximab. Entre ellos destacan: infección post-vacunal, linfoma de células T hepatoesplénico, carcinoma de células de Merkel, infarto de miocardio, pérdida visual transitoria, fallo hepático y empeoramiento síntomas dermatomiositis.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su reumatólogo.